

Vaccination contre la grippe

Les conclusions de la HAS à connaître

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié le 9 juillet 2026 une recommandation sur la vaccination contre la grippe saisonnière.

Ce que relève la HAS concernant la vaccination des professionnels



Une efficacité directe variable

L'efficacité vaccinale chez l'adulte en vie réelle varie **entre 41 % et 76 %** sur les trois dernières années. Les méta-analyses rapportent des estimations autour de **40-67 %**.



Une protection indirecte des patients insuffisamment établie

Les données disponibles sur l'impact de la vaccination des professionnels de santé pour protéger les patients sont limitées, avec un niveau de preuve faible à modéré.



Des limites méthodologiques importantes

Les données analysées présentent généralement un niveau de preuve faible, avec d'importants biais méthodologiques.



Extraits de la Recommandation de la HAS du 9 juillet 2026 (pages 86 et 87)

« Pour l'ensemble des critères analysés, les données identifiées sont caractérisées par **d'importantes limites méthodologiques**, ce qui conduit à un **niveau de preuve généralement faible rendant difficile l'interprétation des résultats**. L'efficacité directe du vaccin contre la grippe est **difficile à évaluer avec précision**. Elle est **variable d'une année à l'autre** selon le degré de concordance entre les souches en circulation et celles incluses dans le vaccin... **L'EV directe contre la grippe confirmée, les hospitalisations et la survenue d'une pneumonie chez l'adulte est modérée. La qualité méthodologique des études est faible à modérée.** »

HAS, 9 juillet 2026, p. 86

« Chez les **personnes hébergées en milieu de soins**, les revues rapportent peu ou pas d'effet sur la grippe confirmée ou les hospitalisations, mais un effet probable sur les infections respiratoires basses (RD ≈ - 2 %) et la mortalité toutes causes (RR ≈ 0,69). **Les données disponibles** sur l'impact de la vaccination des professionnels de santé pour protéger les patients **sont limitées**, avec des critères de jugement non spécifiques à la grippe, et **présentent un niveau de preuve faible à modéré.** »

HAS, 9 juillet 2026, p. 87

« Enfin, les études observationnelles suggérant un **lien entre augmentation de la couverture vaccinale des soignants et baisse des infections nosocomiales** reposent sur un **faible niveau de preuve** et **ne permettent pas d'identifier un seuil de couverture efficace.** »

HAS, 9 juillet 2026, p. 87



S'informer sur les bénéfices attendus et les limites des données disponibles est une condition essentielle d'un **consentement libre et éclairé**.



Retrouvez l'intégralité de nos analyses, nos actualités et nos ressources sur :

www.syndicat-liberte-sante.com